

Pré-teste

PRÉ-TESTE

Nome: _____ Data: / /20__

Profissão: _____

	Pergunta	Respostas	Resposta Correcta
Módulo 1: Introdução ao Programa de Reabilitação Nutricional (PRN)			
1.	Desnutrição aguda manifesta-se através de:	A. Emagrecimento B. Edema bilateral C. Baixa estatura para idade D. A e B E. Todos itens acima mencionados	
2.	O diagnóstico clínico de um doente com emagrecimento grave é:	A. Kwashiorkor B. Marasmo	
3.	O diagnóstico clínico de um doente com edema bilateral é:	A. Kwashiorkor B. Marasmo	
4.	PRN inclui os seguintes componentes:	A. Envolvimento comunitário B. Tratamento da Desnutrição no Internamento (TDI) C. Tratamento da Desnutrição em Ambulatório (TDA) D. Suplementação alimentar E. Educação nutricional e demonstrações culinárias F. Todos itens acima mencionados	
Módulo 2: Definição e Medição da Desnutrição Aguda			
5.	Que é(são) o(s) indicador(es) usado(s) para identificar a desnutrição aguda, nas crianças entre os 6-23 meses?	A. Edema Bilateral B. Perímetro Braquial (PB) C. Peso-para-Comprimento (P/C) D. Peso-para-Altura (P/A) E. A, B e C F. A, B e D G. Todos itens acima mencionados	
6.	Que é(são) o(s) indicador(es) usado(s) para identificar a desnutrição aguda, nas crianças e adolescentes entre os 5-18 anos?	A. Edema Bilateral B. Perímetro Braquial (PB) C. Peso-para-Altura (P/A) D. Índice da Massa Corporal-para-Idade (IMC/Idade) H. A, B e C E. A, B e D F. Todos itens acima mencionados	
7.	Em que braço deve ser medido o Perímetro Braquial?	A. Direito B. Esquerdo	
8.	Quando o edema encontra-se nos pés e pernas-pretibial é classificado como:	A. Edema ligeiro (+) B. Edema moderado (++) C. Edema grave (+++)	

	Pergunta	Respostas	Resposta Correcta
Módulo 3: Critérios e Procedimentos na Admissão			
9.	Uma criança de 8 meses, com PB < 11.5 cm, sem edema e sem complicações deve ser admitida:	A. Tratamento da Desnutrição no Internamento (TDI) B. Tratamento da Desnutrição em Ambulatório (TDA) C. Suplementação alimentar	
10.	Uma criança de 8 meses, com P/C \geq -3 DP & < -2 DP, com edema e sem complicações deve ser admitida:	A. Tratamento da Desnutrição no Internamento (TDI) B. Tratamento da Desnutrição em Ambulatório (TDA) C. Suplementação alimentar	
11.	Uma criança de 6 anos, com IMC/Idade < -3 DP, sem edema e sem complicações deve ser admitida:	A. Tratamento da Desnutrição no Internamento (TDI) B. Tratamento da Desnutrição em Ambulatório (TDA) C. Suplementação alimentar	
12.	O critério para passar o Teste do Apetite é quando uma criança ou adolescente come pelo menos:	A. Um terço (1/3) de uma saqueta de ATPU ou 3 colherinhas B. Metade (1/2) de uma saqueta de ATPU ou 4 colherinhas C. Toda a saqueta de ATPU	
13.	Quando é que o Teste do Apetite deve ser feito?	A. Antes de determinar se o doente tem complicações B. Depois de determinar se o doente tem complicações	
Módulo 4: Tratamento da Desnutrição em Ambulatório (TDA)			
14.	Quando é que os antibióticos devem ser administrados em doentes no TDA?	A. Quando a infecção é identificada B. Na admissão C. Na segunda semana de tratamento D. Na 4 ^a semana ou no momento da alta	
15.	Para uma criança admitida no TDA que não recebeu uma dose de vitamina A nos últimos 4 meses, e que não tem manifestações clínicas de deficiência, quando é que se deve dar uma dose de vitamina A?	A. Não deve dar B. Na admissão C. Na segunda semana de tratamento D. Na 4 ^a semana ou no momento da alta	
16.	Qual é o alimento terapêutico oferecido aos doentes com desnutrição aguda grave no TDA?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus F. C e D	
17.	Quais são os critérios para alta no TDA?	A. Tem P/E ou IMC/Idade \geq - 1 DP em 2 pesagens sucessivas B. Tem apetite C. Pode comer a comida da família D. Todos itens acima mencionados	

	Pergunta	Respostas	Resposta Correcta
Módulo 5: Tratamento da Desnutrição no Internamento (TDI)			
18.	Quem recebe o tratamento no TDI?	A. Doentes com DAG com complicações médicas B. Doentes com DAG com edema C. Doentes com DAG que não passam o Teste de Apetite D. Crianças menores de 6 meses ou com peso corporal inferior a 4 Kg E. Todos itens acima mencionados	
19.	Qual é o alimento terapêutico oferecido aos doentes com desnutrição aguda grave na fase de estabilização?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus F. A e B	
20.	Qual é o alimento terapêutico oferecido aos doentes com desnutrição aguda grave na fase de transição?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus F. B e D	
21.	Qual é o alimento terapêutico oferecido aos doentes com desnutrição aguda grave na fase de reabilitação no internamento?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus F. B e D	
22.	Quais são os critérios para passar para a fase de reabilitação no ambulatório?	A. Bom apetite: consumindo pelo menos 80% da quantidade diária do ATPU B. Não tem edema durante 7 dias C. Ausência de complicação médica D. Clinicamente bem e alerta E. Todos itens acima mencionados	
Módulo 6: Protocolo para crianças menores de 6 meses ou com peso corporal inferior a 4 Kg			
23.	Uma criança menor de 6 meses pode ser admitida no TDI com base em: risco elevado de desenvolver DAG devido a uma alimentação inadequada, mesmo que não tenha sinais aparentes de emagrecimento e edema bilateral?	A. Verdadeiro B. Falso	
24.	Que alimento terapêutico, devem receber as crianças menores de 6 meses com emagrecimento acentuado (marasmo) na fase de estabilização?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus	
25.	Que alimento terapêutico, devem receber as crianças menores de 6 meses com edema bilateral (kwashiorkor) na fase de estabilização?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus	

	Pergunta	Respostas	Resposta Correcta
26.	Qual é o alimento terapêutico oferecido às crianças menores de 6 meses com desnutrição aguda grave na fase de transição?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus	
27.	Qual é o alimento terapêutico oferecido às crianças menores de 6 meses com desnutrição aguda grave na fase de reabilitação?	A. F75 B. F100 C. F100-diluído D. ATPU E. CSB-Plus	
Módulo 7: Protocolo para doentes com desnutrição aguda moderada e idade superior a 6 meses			
28.	Nos distritos em que as Unidades Sanitárias tem CSB-Plus disponível e é oferecido como suplemento alimentar as crianças com desnutrição aguda moderada, qual é a quantidade diária que uma criança de 8 meses deve consumir?	A. 50 gramas B. 100 gramas C. 200 gramas D. 300 gramas	
29.	Nos distritos em que as Unidades Sanitárias não tem CSB-Plus disponível, qual é a quantidade diária de ATPU uma criança com 8 meses deve consumir?	A. 1 saqueta B. 2 saquetas C. Não deve dar nada	
30.	Quando é que a criança tem alta com CSB-Plus ou ATPU?	A. Tem P/E ou IMC/Idade ≥ -1 DP em 2 pesagens sucessivas B. Depois de 3 meses a receber CSB-Plus ou ATPU C. Depois de 6 meses a receber CSB-Plus ou ATPU	